



## Weed Mix PollenGuard™

### HOMEOPATHIC SUBLINGUAL SCHEDULE AND DIRECTIONS FOR USE. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE COMMENCING.

To be used on the advice of a homeopathic practitioner, healthcare practitioner or physician.

Note: this is a general schedule...specific inquiries should be directed to your healthcare provider.

The homeopathic solution contains allergens prepared specifically for your homeopathic immunotherapy.

#### Composition

In a 5ml vial of Homeopathic Solution:

Medicinal Ingredients:

*Xanthium commune*, Cocklebur (Source: Pollen); *Iva ciliata*, Rough Marsh Elder (Source: Pollen); *Plantago lanceolata*, English Plantain (Source: Pollen); *Chenopodium album*, Lambs Quarters (Source: Pollen)  
Regular Strength 2X, 25 SPU/ml

Non-medicinal Ingredients:

Glycerin 50%  
Phenol 0.4%  
Water for Injection qsp 5ml

#### Dosage form

Homeopathic solution for sublingual swallow.

#### Manufacturer

Western Allergy Services Ltd.  
Mississauga, ON L4Z 2H6

#### Indications

Documented allergies to weed pollens manifest specifically by rhinitis, conjunctivitis, rhinoconjunctivitis.

When the etiological factors are clearly identified the objective of specific homeopathic immunotherapy is to lessen the clinical consequences of a meeting of the sensitized organ with the allergen.

#### CONTRA-INDICATIONS

Unstable asthma, severe immunodeficiencies, malignancies, autoimmune disease or Beta Blockers.

Patients on Beta Blockers: These patients are probably more prone to severe reactions to homeopathic immunotherapy and such reactions may be less responsive to conventional treatment of anaphalaxis.

#### DO NOT GIVE HOMEOPATHIC IMMUNOTHERAPY TO PATIENTS ON BETA BLOCKERS.

#### CAUTIONS AND WARNINGS

Patients who are undergoing specific homeopathic immunotherapy, should have their symptoms controlled beforehand, if necessary, with an adequate treatment under medical supervision.

It is recommended that patients for whom homeopathic sublingual or oral administration of allergens has been recommended, patients should have permanently at their disposal the usual symptomatic treatments such as anti-histamine.

#### PRECAUTIONS

If mouth, throat, chest or abdominal discomfort occurs or if experiencing hives, itching or shortness of breath, treatment with antihistamine should be immediately undertaken. Consult a healthcare practitioner if symptoms persist or worsen. Do not take further doses until consulting with your healthcare provider.

#### INTERACTIONS

Interactions with other drugs and medicines have not been investigated.

#### PREGNANCY AND LACTATION

Do not use if pregnant or breast feeding.

#### EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE OR TO USE MACHINES

No known effects.

#### POSOLOGY AND METHOD OF ADMINISTRATION

##### Conditions of use

Specific homeopathic immunotherapy should be undertaken when indicated.

##### Age

Treatment may be commenced after age 3 if more than 6 months of rhinoconjunctivitis has been experienced and documented for allergies to weed pollens.

##### Known adverse events

Oro-pharyngeal discomfort and moderate syndromic reactions (such as urticaria, rhinitis or asthma).

##### Posology and method of administration

Dosage does not vary with age, but it may be adapted to the special reactivity of each individual.

##### The treatment is

- a maintenance treatment of constant dosage.

#### DOSAGE

Take 1 drop (0.05ml) 2 or 3 times per day before meals.

The drop of extract may be placed under the tongue, retained under the tongue for 2 minutes, then swallowed (sublingual swallow route).

This therapeutic plan is only indicative and may be modified according to the condition of the patient and possible reactions.

We recommend using 5 or more minutes before food, drink or brushing teeth.

#### SHELF LIFE

The expiry date is clearly indicated on the vial and on the box label. Do not use the homeopathic solution after this date. The homeopathic solution should be stored between 2-8 degrees Celsius.

PollenGuard™ may be used either:

##### PRE-SEASONALLY

Begin treatment 30 days prior to pollen season and continue until the end of pollen season

or

##### CO-SEASONALLY

Treat year-round for 3-5 years then discontinue (depending on individual results).

Most patients should start treatment 30 days before season	BC	Prairies	Ontario	Quebec	Atlantic Canada
<b>Trees</b>	Feb-May	Mar-May	Mar-June	Mar-June	Apr-May
<b>Grasses</b>	May-July	May-Aug	June-Aug	May-Sept	June-Sept
<b>Ragweed</b>	N/A	July-Sept	Aug-Sept	Aug-Sept	Aug-Oct
<b>Weeds</b>	July-Sept	July-Sept	Aug-Sept	Aug-Sept	Aug-Sept

#### DATE OF REVISION OF THE PACKAGE INSERT

November 2007

[www.pollenguard.com](http://www.pollenguard.com)



## Mélange de mauvaises herbes PollenGuard™

### ÉCHÉANCIER ET MODE D'EMPLOI DE PRISE SUBLINGUALE HOMÉOPATHIQUE PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER.

Doit être utilisé sur les conseils d'un praticien homéopathe, d'un prestataire de soins de santé ou d'un médecin.

Remarque : il s'agit d'un échéancier général...

Les questions particulières doivent être adressées au prestataire de soins.

La solution homéopathique contient des allergènes préparés spécifiquement pour votre immunothérapie homéopathique.

#### Composition

Dans un flacon de 5 ml de solution homéopathique :

Ingrédients médicinaux :

*Xanthium commune*, lampourde (source : pollen); *Iva ciliata*, ive à fleurs axillaires

(source : pollen); *Plantago lanceolata*, plantain lancéolé (source : pollen); *Chenopodium album*, chénopode blanc (source : pollen)

Force régulière 2X, 25 UPS/ml

Ingrédients non médicinaux :

Glycérine 50 %

Phénol 0,4 %

Eau pour injection qsp 5 ml

#### Forme de dosage

Solution homéopathique pour traitement sublingual puis oral.

#### Fabricant

Western Allergy Services Ltd.

Mississauga, ON L4Z 2H6

#### Indications

Allergies documentées aux pollens de mauvaises herbes qui se manifestent spécifiquement sous forme de rhinite, conjonctivite, rhinocjonctivite.

Lorsque les agents causals sont clairement identifiés, le but de l'immunothérapie homéopathique spécifique est de réduire les répercussions cliniques de la rencontre de l'allergène et de l'organisme sensibilisé.

#### CONTRE-INDICATIONS

Asthme instable, immunodéficiences sévères, malignités, maladie auto-immune ou bêtabloquants.

Patients sous bêtabloquants : Ces patients sont probablement plus susceptibles d'avoir des réactions graves à l'immunothérapie homéopathique, et il est possible que ces réactions répondent moins bien au traitement conventionnel de l'anaphylaxie.

#### NE PAS ADMINISTRER L'IMMUNOTHÉRAPIE HOMÉOPATHIQUE AUX PATIENTS SOUS BÊTABLOQUANTS.

#### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Il est nécessaire que les symptômes des patients subissant l'immunothérapie homéopathique spécifique soient maîtrisés auparavant, le cas échéant, au moyen d'un traitement adéquat sous surveillance médicale.

Il est recommandé que les patients pour qui on a prescrit l'administration homéopathique sublinguale ou orale d'allergènes aient en permanence à leur disposition les traitements symptomatiques habituels tels qu'un antihistaminique.

#### PRÉCAUTIONS

Si un malaise survient au niveau de la bouche, de la gorge, de la poitrine ou de l'abdomen, ou si le sujet éprouve de l'urticaire, des démangeaisons ou un essoufflement, il convient de démarrer immédiatement un traitement antihistaminique. Si les symptômes persistent ou empirent, consulter immédiatement un prestataire de soins de santé. Ne pas prendre d'autres doses avant d'avoir consulté votre prestataire de soins de santé.

#### INTERACTIONS

Aucune recherche n'a été effectuée sur les interactions du produit avec d'autres drogues et médicaments.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Les femmes enceintes et les mères allaitantes ne doivent pas utiliser ce produit.

#### EFFETS SUR LA CAPACITÉ À CONDUIRE OU UTILISER DES MACHINES

Aucun effet connu.

#### POSOLOGIE ET MÉTHODE D'ADMINISTRATION

##### Conditions d'emploi

L'immunothérapie homéopathique spécifique doit être entreprise selon les indications temporelles.

##### Âge

Le traitement peut être donné après que le sujet soit âgé de trois ans s'il a déjà été atteint de rhinocjonctivite allergique aux pollens de mauvaises herbes pendant plus de 6 mois et que celle-ci a fait l'objet d'une documentation.

##### Effets indésirables connus

Gêne oropharyngienne et réactions syndromiques modérées (telles qu'urticaire, rhinite ou asthme).

##### Posologie et méthode d'administration

Le dosage ne varie pas en fonction de l'âge mais il pourra être adapté en fonction de la réactivité particulière de chaque personne.

##### Le traitement est

- un traitement d'entretien à dosage constant.

#### DOSAGE

Prendre 1 goutte (0,05 ml) 2 ou 3 fois par jour avant les repas.

La goutte d'extrait doit être placée sous la langue, gardée sous la langue pendant 2 minutes, puis avalée (voie sublinguale puis orale).

Ce plan thérapeutique est donné uniquement à titre d'indication et il peut être modifié en vertu de l'état du patient et de réactions possibles.

Nous recommandons d'attendre au moins 5 minutes avant de consommer des aliments ou des boissons ou de se laver les dents.

#### DURÉE DE CONSERVATION

La date d'expiration est clairement indiquée sur le flacon et sur l'étiquette de la boîte. Ne pas utiliser la solution homéopathique après cette date. La solution homéopathique doit être conservée à une température située entre 2 et 8 degrés Celsius.

PollenGuard™ peut être utilisé en :

#### TRAITEMENT PRÉSAISONNIER

Démarrer le traitement 30 jours avant la saison pollinique et le poursuivre jusqu'à la fin de la saison

ou en :

#### TRAITEMENT COSAISONNIER

Donner le traitement à longueur d'année pendant 3-5 ans puis l'arrêter (selon les résultats individuels).

La plupart des patients commencent le traitement 30 jours avant la saison	C.-B.	Prairies	Ontario	Québec	Canada atlantique
<b>Arbres</b>	fév.-mai	mars-mai	mars-juin	mars-juin	av.-mai
<b>Herbes</b>	mai-juil.	mai-août	juin-août	mai-sept.	juin-sept.
<b>Herbe à poux</b>	S.O.	juil.-sept.	août-sept.	août-sept.	août-oct.
<b>Mauvaises herbes</b>	juil.-sept.	juil.-sept.	août-sept.	août-sept.	août-sept.

#### DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

Novembre 2007

[www.pollenguard.com](http://www.pollenguard.com)